

# BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

---



**Séance du 12 juillet 1916.**

Présidence de M. J. DE JOANNIS.

*Nouvelles de nos collègues aux Armées.* — Nous avons reçu de bonnes nouvelles du capitaine D. LUCAS, de M. P. LESNE et de M. J. BONDROIT, ce dernier mobilisé de nouveau dans l'Armée belge.

*Changement d'adresse.* — M. le Dr BERGROTH, à Jämsän (Finlande).

*Présentation.* — M. Henri TEYSSIER, présenté par M. J. KÜNCKEL d'HERCULAIS. — Commissaires-Rapporteurs : MM. Ch. LAHAUSOIS et J. MAGNIN.

*Prix Constant 1915.* — Le Secrétaire donne lecture d'une lettre de M<sup>me</sup> Jean CHATANAY, remerciant la Société du nouvel hommage qu'elle vient de rendre à la mémoire de son mari en lui décernant, à l'unanimité, le prix Constant 1915.

---

## Communications

**Descriptions de plusieurs espèces d'Arachnides  
récemment découvertes en France [Troisième note] (1)**

par E. SIMON.

**Misumena personata**, n. sp. — ♂. Blanc testacé, avec l'aire oculaire brumâtre liserée de blanc, parfois le céphalothorax fauve avec deux bandes brunes, l'abdomen blanc mat marqué en dessus de chaque côté d'une bande oblique brun-rouge, en arrière d'une bande trans-

(1) Pour la 1<sup>re</sup> note, cf. *Bull. Soc. ent. Fr.* [1914], pp. 470-474; pour la 2<sup>e</sup> note, *ibid.* [1914], pp. 478-479.

verse noire, les tibias et métatarses (parfois les fémurs et tarses) des deux premières paires annelés de brun-violet. Fémurs antérieurs armés, sur leur face interne, de 2 ou 3 petites épines, sur leur face dorsale de 2 ou 3 épines encore plus petites. — ♀. Diffère de *M. raticia* Cl. par le groupe oculaire rouge-violet liseré de blanc mat, figurant un triangle transverse, l'abdomen et les pattes entièrement blancs, le tibia de la 1<sup>re</sup> paire armé en dessous de deux rangées de 6-7 petites épines atteignant la base de l'article. ♂ long. 3 à 3,5 mm.; ♀ long. 7 à 7,5 mm. — Espèce surtout voisine de *M. Clarki* Warburton, de Madère.

Pyréénées-Orientales : Banyuls-sur-Mer (L. FAGE, L. BERLAND). — Aussi en Espagne dans la province de Huesca.

**Thanatus jugorum**, n. sp. — ♀. Voisin de *T. striatus* C. K. (*hirsutus* Cb.), en diffère par le tibia de la 4<sup>e</sup> paire pourvu en dessus d'une épine, le sternum noir, les pattes fauve obscur non ponctuées, mais avec les fémurs rembrunis au moins en dessus, la plaque génitale divisée par un sillon longitudinal, un peu dilaté en arrière où il renferme une pièce triangulaire à sommet antérieur très aigu. Long. 5,5 à 6 mm.

Pyréénées-Orientales : le Canigou, à de grandes altitudes sous les pierres !.

**Tegenaria ligurica**, n. sp. (groupe de *T. picta* E. S.). — ♂. Diffère de *T. picta* par le tibia de la patte-mâchoire plus long que large, sans apophyse apicale, pourvu d'une apophyse externe submédiane, surélevée, arquée en avant, conique obtuse, et d'une apophyse infère conique subaiguë. — ♀. Fossette génitale semicirculaire transverse, divisée par un septum fauve, triangulaire aigu, à sommet antérieur. — ♂ ♀. Abdomen noirâtre ponctué, orné d'une bande entière d'un rouge sombre, bordée en avant, de chaque côté, d'une bande jaune oblique, segmentée en arrière de fins accents jaunes. — ♂ ♀ long. de 7 à 12 mm.

Alpes-Maritimes : Menton, le Moulinet, Peira-Cave (C<sup>te</sup> DE DALMAS 1915).

**Tegenaria nemorosa**, n. sp. (groupe de *T. domestica* Cl.), surtout voisin de *T. pagana* C. K. — ♂. En diffère par le tibia de la patte-mâchoire armé de deux apophyses externes subapicales, presque accolées à l'apophyse angulaire, gémées : la supérieure fine aiguë, l'inférieure plus longue, plus large et plus courbée. Pattes annelées, leurs fémurs non rembrunis. — ♀. Fossette génitale très superficielle

blanche, ovale transverse, bordée d'une ligne chitinisée brune, coupée, au milieu du bord postérieur, d'une petite pièce trapézoïde. — ♂ ♀ long. de 6 à 10 mm.

Var. : forêt du Dom!; Alpes-Maritimes : Cagnes (L. et J. BERLAND)

**Tegenaria oribata**, n. sp. (groupe de *T. armigera* E. S.). — ♂ ♀. Diffère de *T. armigera* E. S. par les yeux médians postérieurs beaucoup plus séparés l'un de l'autre que des latéraux et le bandeau environ de la largeur des yeux latéraux antérieurs. Fauve testacé avec l'abdomen passant au gris-noirâtre en dessus. Taille petite, ♂ ♀ long. 4 à 5 mm.

Pyrénées-Orientales : forêts du Canigou!.

**Tegenaria antrorum**, n. sp. (groupe de *T. armigera* E.S.) — ♀. Voisin de *T. Racovitzai* E. S., en diffère par les yeux postérieurs plus gros, en ligne légèrement récurvée, les yeux antérieurs en ligne droite, équidistants. Fauve testacé, garni de pubescence blanche en partie plumeuse. Plaque génitale rougeâtre, pileuse, creusée d'une dépression plus large que longue, renfermant en arrière un tubercule blanc obtusément triangulaire. — Long. 8 mm.

Pyrénées-Orientales : grotte de Villefranche!.

**Cicurina Raymondi**, n. sp. — ♀. Diffère de *C. cinerea* Panzer par les yeux antérieurs plus espacés, vus en avant en ligne droite, les médians beaucoup plus petits que les latéraux et plus petits que les médians postérieurs, le bandeau trois fois plus large que les yeux latéraux antérieurs, les tibias antérieurs pourvus (indépendamment de leurs épines inférieures) de deux épines apicales plus petites, la plaque génitale plus large que longue, ovale, coupée d'une fossette en fente transverse, amincie et récurvée dans le milieu. — Long. 4 mm.

Basses-Pyrénées : Gabas, Laffau (C<sup>te</sup> DE DALMAS).

### Un nouveau *Ponera* de France [HYM. FORMICIDAE]

par J. BONDROIT.

Notre excellent collègue du Muséum, M. P. LESNE, ayant eu l'amabilité de me confier quelques Fourmis récoltées par lui aux environs de Paris, j'ai eu le plaisir d'y découvrir une forme nouvelle de *Ponera* dont voici la description sommaire :